



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W MIĘDZYRZECZU

Adresaci wg. rozdzielnika

Nasz znak: PIW-03- koresp. PIW AI - 03. 2021

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzyrzeczu informuje o wystąpieniu ogniska grypy ptaków u drobiu przyzagrodowego w powiecie żarskim woj. lubuskie i realnym wysokim zagrożeniu wystąpienia HPAI u drobiu w powiecie.

W związku z powyższym poleca się od zaraz :

1. Bezwzględnie przestrzegać bioasekuracji przy utrzymywaniu drobiu fermowego i przyzagrodowego.
2. Drób przyzagrodowy utrzymywać w sposób zabezpieczający przed kontaktem z ptactwem dzikim, w tym między innymi : karma i woda powinny być w pomieszczeniu, do obsługi należy stosować odrębną odzież i obuwie, najlepiej drób utrzymywać wyłącznie w kurnikach, zapewnić matę dezynfekcyjną w wejściu do kurnika, zabezpieczyć paszę i ściółkę przed dostępem ptactwa i gryzoni, prowadzić spis drobiu.
 - osoby utrzymujące drób na potrzeby własne mają obowiązek zgłoszenia tego do PIW .W załączeniu przekazuję druk zgłoszenia, z prośbą o zwrotne przekazanie do PIW przez osoby utrzymujące drób przyzagrodowy aktualizacji zgłoszenia – **do dnia 22.02.2021r.**
3. Fermy drobiu, jako podmioty nadzorowane mają obowiązek prawny :
 - zgłaszać do PLW każde wstawienie drobiu – brak tych zgłoszeń jest uchybieniem rzutującym na spełnienie wymogów w zakresie bioasekuracji ferm i ewentualne przyznanie odszkodowania
 - bieżącego analizowania spożycia paszy i wody przez drób, upadków, innych objawów grypy ptaków.
4. Zakłady wylęgu drobiu i przewoźnicy drobiu:
 - na bieżącego należy analizować parametry lęgu w wylęgarniach.
 - zachować bioasekurację przy rozładunku / załadunku piskląt.
- 5 . Natychmiast zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta, policja):
 - każdy przypadek podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.
 - znalezienie chorych lub padłych ptaków dzikich.
 - znalezienie padłego drobiu.

Ponawiam informację , że **niezbędne jest pilne podjęcie działań** w celu odnajdywania zwłok ptactwa dzikiego w miejscach ich bytowania tj. w lasach, parkach, zbiornikach wodnych – przez

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Zakaszewskiego 2,66-300 Międzyrzecz

tel.: (95) 741-22-38, fax: (95) 741-22-38, e-mail: miedzyrzecz.piw@wet.zgora.pl,



służby Gminne , Miejskie, Nadleśnictwa, myśliwych oraz wyczerpanie społeczeństwa w zakresie znalezienia zwłok ptactwa dzikiego.

Gminy, Nadleśnictwa i Koła Łowieckie proszę o zwrotne przekazanie informacji odnośnie działań podejmowanych w w/w zakresie.

W przypadku znalezienia zwłok ptactwa dzikiego należy to natychmiast zgłosić do PLW, Wójta, Burmistrza , Policji oraz dopilnować zabezpieczenia tego uprz do czasu przybycia przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej.


Urzędy Gmin i Urzędy Miejskie proszę o pilne rozpowszechnienie powyższego w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, w tym za pośrednictwem Sołtysów.

Właściciele ferm drobiu , ZWD, firm transportujących drób , zakładów branży spożywczej proszę o bezwzględne przestrzeganie bioasekuracji w zakresie prowadzonej działalności.

Urzędowych lekarzy weterynarii i lekarzy weterynarii wolnej praktyki proszę o zamieszczenie powyższego w widocznym miejscu w prowadzonym zakładzie leczniczym dla drobiu oraz rozpowszechnianie podczas wykonywania czynności zawodowych.

Otrzymują:

1. Urzędy Gmin, Urzędy Miejskie – wszystkie.
2. Fermy drobiu- wszystkie.
3. Zakłady wylęgu drobiu- wszystkie .
4. Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu drobiu- wszystkie.
5. Nadleśnictwa : Babimost, Bolewice, Karwin, Międzychód, Międzyrzecz, Skwierzyna, Trzciel.
6. Koła Łowieckie – wszystkie.
7. Zakłady branży spożywczej – wszystkie.
8. Urzędowi Lekarze Weterynarii – wszyscy.
9. Lekarze weterynarii wolnej praktyki- wszyscy.
10. BIP PIW Międzyrzecz
11. Zespoły PIW- wszystkie.
12. a/a

Powiatowy Zarząd Weterynarii
w Międzyrzeczu
lek. wet.  Marek Janusz

Do wiadomości:

1. Starosta Międzyrzecki .
2. KPP Międzyrzecz .
3. KPPSP w Międzyrzeczu
4. PPIS w Międzyrzeczu
5. PZŁ Zarząd Okręgowy w Gorzowie Wlkp.
6. Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu.
7. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gorzowie Wlkp.
8. GDDKIA w Zielonej Górze
9. ARiMR BP w Międzyrzeczu
10. ODR w Kalsku Filia w Międzyrzeczu
11. Dowódca 17 WBZ w Międzyrzeczu
12. Dowódca 35 Skwierzyńskiego Dywizjonu Obrony Rakietowej w Skwierzynie
13. Dowódca 151 Batalionu Lekkiej Piechoty w Skwierzynie

Proszę zwrócić przekazać wypełniony druk do 22.02.2021r. do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzyrzeczu , ul. Zakaszewskiego 2 , 66-300 Międzyrzecz ;
e-mail: miedzyrzecz.piw@wet.zgora.pl ; tel/fax 95 7412238

.....
/ miejscowość, data/

.....
/Dane posiadacza drobiu/

.....
/Adres/

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Międzyrzeczu
ul. Zakaszewskiego 2
66-300 Międzyrzecz

Zgłoszenie posiadania drobiu i innego ptactwa – aktualizacja luty 2021r.

Zgłaszam posiadanie drobiu lub innego ptactwa – stan na luty 2021r.

1. Adres miejsca utrzymywania :

2. Gatunek :

a/ kuryszt.

b/ kogutyszt.

c/ kaczkiszt.

d/ indykiszt.

e/ perliczkiszt.

f/ bażantyszt.

g/ gołębieszt.

h/ inne tj.szt.

.....
/ Podpis właściciela /

Telefony kontaktowe do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzyrzeczu :

95 741 22 38 ; 602 452 631 -w godzinach pracy
696 080 727 - całodobowo

Podstawowe wymogi bioasekuracji:

1. Specjalna odzież i obuwie ochronne przeznaczone tylko do wykonywania prac (karmienie, pojenie, czyszczenie itp.) z drobiem;
 2. Posiadanie na stanie mat dezynfekcyjnych, w takiej liczbie, która zapewnia zabezpieczenie wszystkich wejść i wjazdów do gospodarstwa w przypadku wystąpienia zagrożenia chorobą;
 3. Posiadanie na stanie takiej ilości środków dezynfekcyjnych, żeby wystarczyły one do przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji,
 4. Budynki, w których utrzymywany jest drób, powinny być:
 - zabezpieczone przed dostępem zwierząt innych niż drób utrzymywany w gospodarstwie, w tym dzikich ptaków;
 - utrzymywane w czystości.
 5. W gospodarstwie należy wydzielić miejsca do składowania:
 - środków dezynfekcyjnych (miejsce te musi być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych),
 - obornika,
 - produktów leczniczych weterynaryjnych.
 6. Umieszczenie przy wejściach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta, tablic z napisem „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
7. Zakaz:
- 1) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 - 2) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych; zakaz ten nie dotyczy więc osób utrzymujących ptaki, które nie mieszczą się ww. definicji drobiu.
8. Nakaz:
- 1) utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami.
 - 2) zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne *ptaki*, z wyłączeniem *ptaków* utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 - 3) utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 - 4) przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami oraz karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 - 5) wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 - 6) stosowania przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym.
 - 7) stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

- 8) oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
- 9) powstrzymania się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
- 10) dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności. Zarówno przegląd stad drobiu, jak i prowadzenie dokumentacji musi być prowadzone codziennie, a więc na bieżąco musi być to udokumentowane.

Objawy:

Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to:

- znaczna liczba nagłych padnięć,
- depresja,
- gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj,
- miękkie skorupy jaj,
- objawy nerwowe,
- zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków,
- silne łzawienie,
- obrzęk zatok podoczodołowych,
- kichanie,
- duszność,
- biegunka.

Wystąpienie któregoś z powyższych objawów powinno być zgłoszone do powiatowego inspektoratu weterynarii

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).



Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagle, zwiększone padnięcia drobiu)


Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonek, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

UWAGA! HPAI

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)

Jeżeli utrzymujesz drób, musisz to zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii.



Nie karm i nie pój drobiu na zewnątrz budynków gospodarskich.
Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

Myj i odkażaj narzędzia przeznaczone do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem.

Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób w systemie bezwybiegowym.

Zabezpiecz drób oraz paszę i ściótkę przed kontaktem z dzikim i ptakami.

Nie wnoś na teren gospodarstwa zwłok dzikich ptaków oraz tusz ptaków łownych

Osoby, które uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne nie mogą w ciągu 72 godzin od zakończenia polowania obsługiwać drobiu.

Przed i po obsłudze drobiu umyj ręce wodą z mydłem.
Do pracy z drobiem używaj oddzielnego ubrania oraz butów i pozostawiaj je w kurniku.

Obserwuj stan zdrowia ptaków.
O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

- 1. Przechowywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;**
- 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;**
- 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;**
- 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;**
- 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.**

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność do ruchu; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności